

## 取扱説明書

# バクスミー®点鼻粉末剤3mg


バクスミー®点鼻粉末剤3mg(以下、本剤)をご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

- 本剤は低血糖時の救急治療に用いる薬剤です。
- 本剤の処方を受けた際に、操作確認用デモキット等を用いた使用方法の説明を受けてください。
- **あなたに本剤が必要になった時に備え、ご家族が使用方法を事前に知っておく必要があります。** 保管場所及び使用方法をご家族にお知らせください。

### ご使用になる前に以下のことにご注意ください

- 本剤を使用する直前まで包装用フィルムをはがさないでください。
- 黄色の容器が開いていると、吸湿により本剤が正しく噴霧されなくなるおそれがあります。
- 本剤は一回使い切りのグルカゴン点鼻粉末です。繰り返し使用することはできません。
- 本剤は鼻にのみ使用してください。

### 準備




- 赤色の部分を引っ張り、包装用フィルムをはがしてください。

- 黄色の容器のふたを開け、噴霧器をとりだします。

注意：噴霧する準備ができるまで注入ボタンを押さないでください。

### 噴霧



- 図のように親指と人差し指、中指で噴霧器を持ってください。**試し打ちはしないでください。**



- **人差し指又は中指が鼻に当たるまで、噴霧器の先端を片方の鼻の穴にゆっくり差し込んでください。**



- 注入ボタンを最後まで押し切ってください。
- **緑色の線が見えなくなるまで押し込むと、噴霧が完了します。**

## 投与のあと

- ・ もし意識がない場合は、本剤投与後に横向きに寝かせてください。
- ・ 噴霧器を鼻から抜き、**噴霧器と黄色の容器を廃棄してください。**
- ・ 直ちに主治医と連絡をとり、**医療機関を受診してください。**
- ・ **追加投与による効果は期待できないため、本剤又は他のグルカゴンの追加投与は行わないでください。**
- ・ 本剤の効果は一時的ですので、意識が回復したら、すみやかに糖分を摂取してください。

## 保存と取扱い方法

- ・ **使用するまで包装用フィルムをはがしたり、黄色の容器を開けたりしないでください。**
- ・ 本剤は黄色の容器の包装用フィルムをつけたまま、室温で保存してください。
- ・ 黄色の容器及び個装箱に表示されている使用期限が切れる前に、本剤の再処方を受けてください。



## その他

- ・ **注意：使用したあとは、必要時に備えすみやかに再処方を受けてください。**
- ・ 本剤は子供の手の届かないところに保管してください。

## お問合せ先

ご質問等は、主治医にご相談いただくか、下記までお問い合わせください。

### グローバルレギュラトリーパートナーズ合同会社

医薬情報問合せ窓口

**0120-126-003**\*1

**03-4530-9843**\*2

受付時間(どちらの電話番号ともに)  
月曜日～金曜日 9:00～18:00\*3

- \*1 通話料は無料です。携帯電話からでもご利用いただけます。
- \*2 IP電話からはフリーダイヤルをご利用できない場合があります。その際にはこちらの電話番号にお掛けください。尚、通話料はお客様負担となります。
- \*3 祝祭日および当社休日を除きます。

製造販売元

### グローバルレギュラトリーパートナーズ合同会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル7F

®:登録商標

Copyright ©2024, Global Regulatory Partners. All rights reserved.

作成年月: 2024年12月作成

MI-JP-BAQ-003

**GLOBAL**  
REGULATORY PARTNERS